

# GESTION DE LA PANDEMIE COVID-19 AU NIVEAU HPCI DANS LES EMS

PRISE EN CHARGE		
Résidents SANS infection à CoVID-19	Résident AVEC infection à CoVID-19	≥ 2 résidents CoVID-19 CONFIRMÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Renforcer l'application des <b>Précautions Standard</b> par les professionnels de soins</li> <li>▶ Renforcer l'<u>hygiène des mains</u> des résidents</li> <li>▶ <u>Port de masque chirurgical obligatoire</u> lors d'activité de soins</li> <li>▶ Respecter les <u>mesures de distanciation sociale</u> (selon recommandations OFSP)</li> <li>▶ Mettre en évidence les affiches officielles sur la prévention de l'infection à CoVID-19</li> <li>▶ Anticiper :               <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Informer le personnel</li> <li>▷ Évaluer le stock de matériel de protection disponible (solution hydro-alcoolique, masques et surblouses)</li> <li>▷ Gestion des stocks de médicaments</li> <li>▷ Préparer des procédures organisationnelles (tenue, locaux, déchets...)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Confinement en chambre</li> <li>▶ <b>Mise en place de Mesures Additionnelles Gouttelettes (MAG)</b> : surblouse, masque de soins et port de gants si risque de contact avec les liquides biologiques</li> <li>▶ Evaluation clinique médicale</li> <li>▶ Dépistage CoVID-19 si critères d'infection (<u>Cf. Critères sur le site HPCI</u>)</li> </ul> <div style="text-align: center;"> <p><b>DÉPISTAGE CoVID-19</b></p> <pre>           graph TD             A[DÉPISTAGE CoVID-19] --&gt; B[TEST NÉGATIF et diagnostic alternatif autre fort probable = Cas infirmé]             A --&gt; C[TEST POSITIF = Cas confirmé]             B --&gt; D[▶ Application des Précautions Standard ▶ MAG si symptômes respiratoires]             C --&gt; E[▶ Isolement en chambre individuelle si possible ▶ MAG ▶ Surveillance clinique régulière]           </pre> </div>	<p><b>Arrêter les dépistages systématiques.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <u>Chambre individuelle</u> (ou double en délimitant un périmètre d'isolement) pour chaque nouveau résident suspect</li> <li>▶ <u>Mettre en place une organisation chronologique des soins</u> avec prise en charge des résidents sans infection CoVID-19 en premier, terminer les soins par les résidents avec une infection CoVID-19           <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ <b>MAG</b> (Mesures Additionnelles Gouttelettes: surblouse, masque de soins, et port de gants si risque de contact avec les liquides biologiques)</li> <li>▷ Équipe de soins dédiée</li> <li>▷ Matériel de soins dédié</li> <li>▷ Surveillance clinique régulière</li> </ul> </li> </ul> <p>▶ <b>Si nécessaire :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ <b>Demande de renfort :</b> évaluer le besoin en personnel supplémentaire dans les soins, protection civile, soldats sanitaires, avis équipes mobiles gériatriques, soins palliatifs et psycho-gériatriques)</li> </ul>
<b>Gestion des locaux, linges et déchets : filière habituelle</b>		

## Fin de la période d'isolement

- ▶ 10 jours minimum et 48h sans symptômes
- ▶ Levée des mesures d'isolement et des MAG
- ▶ Maintien de la distanciation sociale (selon recommandations OFSP)

**NB :** Les visites pour le résident en fin de vie sont autorisées, avec encadrement et accompagnement par le personnel.