


## INFORMATION AUX COLLABORATEURS




### Règles du bon usage du masque de soins

Le port de masque s'applique à toutes les personnes en contact avec les patients, aux collaborateurs-trice-s des laboratoires cliniques et aux personnels des cafétérias et restaurants.



Portez le masque de soins en continu jusqu'à 4 heures. Le jeter lors de la pause repas.



Éliminez le masque à la fin d'un enchaînement de soins chez un / des patients COVID-19 positifs.



Désinfectez vous les mains après chaque manipulation du masque.



Ne portez pas un masque souillé.



Évitez de toucher votre masque.



Ne portez pas votre masque sur votre menton.



Ne portez pas le masque sur les cheveux.



Ne mettez pas le masque dans vos poches.



Ne posez pas le masque sur la table.

[www.chuv.ch/coronavirus](http://www.chuv.ch/coronavirus)

# NOUVEAU CORONAVIRUS

Quel masque? Pourquoi? Pour qui? Dans quelle situation?



Qui porte un masque de soins (ou masque chirurgical)?

## PERSONNELS

- TOUS les collaborateurs.trices qui sont en contact avec les patients atteints de COVID-19 ou non (collaborateurs médico-soignants, collaborateurs techniques et logistiques, personnels de desk d'accueil, etc.)
- Les collaborateurs.trices des laboratoires cliniques lorsque la configuration des lieux ne permet pas de respecter la distance sociale de sécurité (2 mètres)
- Les personnels des cafétérias et restaurants du personnel

Le masque de soins protège le collaborateur et les patients contre le risque de transmission par gouttelettes.

## RÈGLES DE BON USAGE

- Le masque de soins peut être gardé en continu jusqu'à un maximum de 4 heures. Il doit être changé s'il est humide, abîmé ou souillé par des liquides biologiques et lors de la pause repas.

## PATIENTS

Uniquement lors des consultations ambulatoires ou déplacements dans l'hôpital

- Ayant des signes d'infection respiratoire: toux, rhume, syndrome grippal, avec ou sans fièvre
- faisant partie du groupe des personnes vulnérables même s'ils n'ont pas de symptômes (> 65 ans, hypertension, diabète, maladie cardiovasculaire, maladie respiratoire chronique, immunosuppression, cancer)
- Patients COVID-19 lorsqu'ils sortent de leur chambre.



Qui porte un masque FFP2?

## PERSONNELS

- TOUS les collaborateurs.trices réalisant des procédures génératrices d'aérosols, chez un patient atteint de COVID-19 ou suspect: principalement bronchoscopie, réanimation, intubation/extubation, aspiration en circuit ouvert, ventilation non invasive/CPAP, Optiflow, physiothérapie respiratoire, expectorations induites, trachéotomie, endoscopie digestive, frottis naso-pharyngé.

Le masque de protection respiratoire FFP2 protège le collaborateur contre le risque de transmission par aérosols.

## RÈGLES DE BON USAGE

- Vérifier l'étanchéité par un fit-check
- Pour assurer une protection efficace, le masque de protection respiratoire FFP2 doit être totalement adhérent au visage; une barbe (même naissante) réduit l'étanchéité du masque au visage et diminue son efficacité globale. Les collaborateurs portant une barbe ou une moustache sont priés de se raser.
- Le masque FFP2 peut être gardé en continu jusqu'à 8h. Il doit être changé s'il est humide, abîmé ou souillé par des liquides biologiques et lors de la pause repas.

## Recommandations pour tous

(synthétisées sous forme de pictogrammes au verso)

Les recommandations pour la protection du personnel CHUV s'appuient sur les recommandations des experts et spécialistes Swissnoso.

- Ne pas toucher le masque une fois en place
- Se désinfecter les mains par friction hydro-alcoolique avant la pose et après le retrait, ainsi qu'après chaque manipulation du masque pour le réajuster
- Ne pas porter le masque sur le menton
- Ne pas porter le masque sur les cheveux
- Ne pas porter un masque souillé
- Ne pas mettre le masque dans les poches
- Ne pas poser le masque sur la table
- Jeter les masques dans une poubelle à déchets urbains (sac noir)